

แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา แผลเลือดออกทั้งชนิดที่ต้องเย็บแผลและไม่ต้องเย็บแผล

ชื่อ-สกุล ..... HN..... อายุ..... น้ำหนัก..... ว/ด/ป.....

ซักประวัติ

- ระยะเวลาการเกิดแผล  
(หากนานกว่า 6 ชั่วโมงและไม่ได้รับการทำความสะอาดแผล อาจจะมีโอกาสติดเชื้อ)
- คุณลักษณะของแผล/ความสกปรก/เนื้อตาย/ขนาดแผล/ตำแหน่งของแผล

กรณีไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะ

- แผลสะอาด
  - ผู้ป่วยมาถึง รพ.ภายใน 6 ชั่วโมง
  - แผลขอบเรียบ ทำความสะอาดง่าย
  - ไม่มีเนื้อตาย
  - ไม่มีสิ่งสกปรกติดในแผลหรือมีแต่ล้างออกง่าย
  - ไม่ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น มูลสัตว์ น้ำคร่ำ

กรณีที่ให้ยาปฏิชีวนะ

- บาดแผลที่มีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าปกติ
    - บาดแผลที่ได้รับการรักษาช้ากว่า 6 ชั่วโมง
    - บาดแผลที่มีสิ่งปนเปื้อนที่มีแบคทีเรียมาก
    - บาดแผลที่ยาวกว่า 5 cm
    - บาดแผลเนื้อตายเป็นบริเวณกว้าง
    - บาดแผลที่ยากต่อการทำความสะอาด เช่น ถูกทิ่มตำเป็นรู
      - บาดแผลจากการบาดเจ็บ
      - แผลที่มีขอบหยึกหยัก ขอบไม่เรียบ
      - แผลที่เก่า
      - บาดแผลในผู้ป่วยเบาหวาน/ ผู้สูงอายุ(65ปีขึ้นไป)/ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง/ผู้เป็นหลอดเลือดส่วนปลายตีบ/ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือทานยากดภูมิคุ้มกัน
  - บาดแผลมีสิ่งปนเปื้อน
    - บาดแผลที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในแผล ไม่สามารถล้างออกได้อย่างทั่วถึง
    - บาดแผลที่สัมผัสกับสิ่งสกปรกที่มีแบคทีเรียจำนวนมาก
- ผู้ป่วยต้องการใช้ ATB  
 มา รพ. > 2 ครั้งใน 1 สัปดาห์  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....

แพทย์/พยาบาลผู้สั่งใช้.....

แบบบันทึกประกอบการวินิจฉัยและการรักษา แผลเลือดออกทั้งชนิดที่ต้องเย็บแผลและไม่ต้องเย็บแผล

ชื่อ-สกุล ..... HN..... อายุ..... น้ำหนัก..... ว/ด/ป.....

ซักประวัติ

- ระยะเวลาการเกิดแผล  
(หากนานกว่า 6 ชั่วโมงและไม่ได้รับการทำความสะอาดแผล อาจจะมีโอกาสติดเชื้อ)
- คุณลักษณะของแผล/ความสกปรก/เนื้อตาย/ขนาดแผล/ตำแหน่งของแผล

กรณีไม่ควรให้ยาปฏิชีวนะ

- แผลสะอาด
  - ผู้ป่วยมาถึง รพ.ภายใน 6 ชั่วโมง
  - แผลขอบเรียบ ทำความสะอาดง่าย
  - ไม่มีเนื้อตาย
  - ไม่มีสิ่งสกปรกติดในแผลหรือมีแต่ล้างออกง่าย
  - ไม่ปนเปื้อนสิ่งที่มีแบคทีเรียมาก เช่น มูลสัตว์ น้ำคร่ำ

กรณีที่ให้ยาปฏิชีวนะ

- บาดแผลที่มีโอกาสติดเชื้อได้มากกว่าปกติ
    - บาดแผลที่ได้รับการรักษาช้ากว่า 6 ชั่วโมง
    - บาดแผลที่มีสิ่งปนเปื้อนที่มีแบคทีเรียมาก
    - บาดแผลที่ยาวกว่า 5 cm
    - บาดแผลเนื้อตายเป็นบริเวณกว้าง
    - บาดแผลที่ยากต่อการทำความสะอาด เช่น ถูกทิ่มตำเป็นรู
      - บาดแผลจากการบาดเจ็บ
      - แผลที่มีขอบหยึกหยัก ขอบไม่เรียบ
      - แผลที่เก่า
      - บาดแผลในผู้ป่วยเบาหวาน/ ผู้สูงอายุ(65ปีขึ้นไป)/ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง/ผู้เป็นหลอดเลือดส่วนปลายตีบ/ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือทานยากดภูมิคุ้มกัน
  - บาดแผลมีสิ่งปนเปื้อน
    - บาดแผลที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ในแผล ไม่สามารถล้างออกได้อย่างทั่วถึง
    - บาดแผลที่สัมผัสกับสิ่งสกปรกที่มีแบคทีเรียจำนวนมาก
- ผู้ป่วยต้องการใช้ ATB  
 มา รพ. > 2 ครั้งใน 1 สัปดาห์  
 เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) .....

แพทย์/พยาบาลผู้สั่งใช้.....