

แบบการประเมินการใช้ยา Pregabalin 75 mg

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย..... HN..... AN..... อายุ.....ปี

สิทธิการรักษา ข้าราชการ จ่ายเอง/รัฐวิสาหกิจ
 ประกันสังคม บัตรทอง อื่นๆ.....

ข้อบ่งชี้

- Diabetic peripheral neuropathy - Pain
- Fibromyalgia
- Neuropathic pain - Spinal cord injury
- Postherpetic neuralgiaที่ใช้ Gabapentin ไม่ได้ผล
- อื่นๆ(ระบุ).....

แพทย์ผู้สั่งจ่าย

(.....)

วันที่.....

ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

(รับทราบยินยอมให้ใช้ได้)

วันที่/...../.....

หมายเหตุ: จำกัดการสั่งใช้ 30 แคปซูล/ครั้ง/คน

กรณี แพทย์ GP สั่งใช้ยา โปรด consult แพทย์เฉพาะทางก่อน

เอกสารอ้างอิง

1. Finnerup NB, Attal N, Haroutounian S, et al: Pharmacotherapy for neuropathic pain in adults: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2015; 14(2):162-173.
2. Cardenas DD, Nieshoff EC, Suda K, et al: A randomized trial of pregabalin in patients with neuropathic pain due to spinal cord injury. Neurology 2013; 80(6):533-539.