

## แบบการประเมินการใช้ยา Antiglaucoma Ophthalmic preparation

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

### ข้อมูลผู้ป่วย

ชื่อผู้ป่วย..... HN..... AN..... อายุ.....ปี

สิทธิการรักษา  ข้าราชการ  จ่ายเอง/รัฐวิสาหกิจ  
 ประกันสังคม  บัตรทอง  อื่นๆ.....

ยา Antiglaucoma ที่ใช้อยู่  Timolol Eye drop 0.5%  Pilocarpine Eye drop 2%

เริ่มใช้ยานี้เมื่อประมาณ วันที่ .....เดือน.....พ.ศ. ....

### ข้อบ่งชี้

- Open-angle glaucoma
- Ocular hypertension
- อื่นๆ(ระบุ)..... (Consult จักษุแพทย์แล้ว)

### ยาที่ต้องการ

จำนวน

- Bimatoprost Eye drop 0.01% in 3 ml (NED) .....
- Brimonidine tartrate Eye drop 0.2% in 5 ml (ค) .....

### เหตุผลประกอบการใช้ยา

- ยา Antiglaucoma ที่ใช้อยู่ ไม่สามารถลดความดันในลูกตาให้อยู่ในขั้นที่ปลอดภัย
- ยา Antiglaucoma ที่ใช้อยู่ ทำให้เกิดผลข้างเคียง คือ
  - Conjunctival hyperemia
  - Pain, Irritation
  - Corneal hypoesthesia
- มีข้อห้ามใช้ topical beta-blockers
- ผู้ป่วยเดิมเคยใช้  Bimatoprost Eye Drop  Brimonidine tartrate Eye drop และทำให้คุมความดันในลูกตาได้อยู่ในขั้นที่ปลอดภัย
- อื่นๆ(ระบุ).....(Consult จักษุแพทย์แล้ว)

### จักษุแพทย์

- พญ. อภิษฎา ปภิรัชนาท  นพ. บุญลือ อรรถเศรษฐ

แพทย์ผู้ส่งจ่าย .....

(.....)

วันที่.....